

Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze

Ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – doporučený postup

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti: výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP
publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, Suppl. č. 1, s. 38-39.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012

Vedení porodu viz *doporučený postup Vedení porodu těhotné s císařským řezem v anamnéze*.

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PŘED STANOVENÍM TAKTIKY VEDENÍ PORODU

Písemná zpráva musí zhodnotit:

- polohu plodu, vitalitu,
- biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL,

- lokalizaci placenty, **zhodnocení vztahu placenty k dolnímu děložnímu segmentu a jizvě po hysterotomii** (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu nebo do oblasti jizvy po hysterotomii, **CAVE** porucha placentace, invaze do děložní stěny),
- množství plodové vody.