

## KAZUISTIKA – Pacientka po amputaci dolní končetiny

Pacientka ve věku 77 let byla přijata na chirurgické oddělení, kde pro progredující gangrénu jí byla před sedmnácti dny amputována levá dolní končetina v oblasti bérce. K následné péči byla přeložena na oddělení dlouhodobě nemocných, kde je nyní druhý den. Pacientka je orientována, časem, místem i osobou. Pacientka udává bolest v oblasti operační rány a zároveň porušený spánek z důvodu bolesti. Pacientce byl naordinován Novalgin 500 mg 1 tbl. à 8 hodin ke zmírnění bolesti. I nadále si však stěžuje, že bolest neustupuje a hodnotí ji intenzitou 7 na numerické škále bolesti (0-10). Pacientka dodržuje diabetickou dietu, ale stále nařiká, že na jídlo nemá ani pomyšlení. Porce však dojídá. Třikrát denně je podáván inzulin subkutánně a třikrát denně má kontrolu glykémie, která je v normě. Dále říká, že se nemůže smířit s tím, jak vypadá, s tím, že se nemůže pohybovat a také s tím, že se o sebe nedokáže postarat. Často pláče, že toto není život a že by raději zemřela. Pro svoji imobilitu se pohybuje pouze v rámci lůžka. Je částečně inkontinentní, moč neudrží hlavně v noci. Po celý den vyžaduje pleny. Na stoličce chodí na mísu velmi nepravidelně. Poslední stolici měla před třemi dny. Špatně spí, i v noci si stěžuje na velké bolesti. Přes den nacvičuje sed v lůžku a na vozíku. Cvičí pravidelně s fyzioterapeutem, ale je velmi pasivní.

### Ošetřovatelský proces u pacientky po amputaci dolní končetiny

#### STUDENTI UTŘÍDÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

##### Identifikační údaje

Jméno a příjmení		Věk	
Bydliště		Vzdělání	
Stav		Oddělení	
Datum přijetí		Den pobytu	
Sběr informací dne			

##### Důvod přijetí

Rodinná anamnéza	
Osobní anamnéza	
Léková anamnéza	
Alergologická anamnéza	
Abúzy	
Gynekologická/urologická anamnéza	
Sociální anamnéza	
Pracovní anamnéza	
Spirituální anamnéza	

## Lékařská diagnóza


## Diagnostické údaje

Ordinovaná vyšetření	Hodnocení
Vyšetření laboratorní	Hodnocení

## Terapie

<b>Konzervativní léčba</b>	
Dietoterapie	
Pohybový režim	
Fyzioterapie	
<b>Medikamentózní léčba</b>	
per os	
s. c., i. v., i. m.	
<b>Chirurgická léčba</b>	
<b>Lokální léčba/převaz</b>	
<b>Invaze</b>	

## Zhodnocení pacienta dle modelu ...

tabulka ke stažení na: <https://vswww1/Poklady%20k%20vuce/Kazuistiky.aspx>

## ZADÁNÍ PRO STUDENTY

1. Stanovte ošetrovatelské diagnózy dle NANDA International 2012-2014 Taxonomie II a uspořádejte je podle priorit.
2. U všech zvolených diagnóz запиšte určující znaky a související faktory nebo rizikové faktory.
3. Vyberte jednu ze stanovených diagnóz a navrhňte u ní cíle, očekávané výsledky a intervence.