

## PEDIATRIE – test B

- 1. Lidský organizmus ve věku 1,5 měsíce od početí se nazývá:**
  - A) plod
  - B) embryo
  - C) blastocysta
  - D) adolescent
- 2. Novorozenecké období zahrnuje:**
  - A) prvních 21 dní od narození
  - B) prvních 28 dní od narození
  - C) prvních 27 dní od narození
  - D) prvních 14 dní od narození
- 3. Za novorozence s nízkou porodní hmotností se označuje dítě s porodní hmotností:**
  - A) nižší než 1 000g
  - B) nižší než 1 500g
  - C) nižší než 2 000g
  - D) nižší než 2 500g
- 4. Kolik gramů přibere kojenec týdně během prvního čtvrt roku života:**
  - A) 100g
  - B) 200g
  - C) 300g
  - D) 400g
- 5. Třiapůl leté dítě se nazývá:**
  - A) předškolák
  - B) kojenec
  - C) batole
  - D) školák
- 6. Které z následujících reakcí a projevů *nejsou typické u zdravého 2-měsíčního kojence (2):***
  - A) reaguje úsměvem na úsměv osoby
  - B) sleduje matku pohledem po místnosti
  - C) přetočí se z břicha na záda
  - D) uchopí do ruky malý předmět
- 7. Strach z cizích lidí a strach z odloučení se náhle objevují u většiny kojenců ve věku:**
  - A) 12 měsíců
  - B) 7 měsíců
  - C) 1 měsíc
  - D) 18 měsíců
- 8. Dítě už ujde samostatně několik kroků, pokud mu nabídnete knihu, otočí stránku, i když ne samostatně, říká „ne“, „máma“, „táta“, mává na rozloučení. Jaký je jeho mentální věk?**
  - A) 8 měsíců
  - B) 12 měsíců
  - C) 15 měsíců
  - D) 18 měsíců
- 9. Ve kterém případě je třeba poslat 2-leté dítě na speciální vyšetření k logopedovi?**
  - A) pokud používá méně než 100 slov
  - B) pokud nepozná a nepoužívá množné číslo
  - C) pokud neumí počítat do tří
  - D) pokud nepoužívá fráze, skládající se ze 2 slov
- 10. Který příznak sexuálního dozrávání je u děvčat první?**
  - A) zrychlený růst
  - B) začátek pubického ochlupení
  - C) zvětšování prsní žlázy
  - D) první menstruace
- 11. Který příznak puberty u chlapců je první?**
  - A) pubické ochlupení
  - B) pigmentace skrota
  - C) prodloužení penisu
  - D) zvětšení testes
- 12. Jaká je koncentrace bílkovin v ženském mléku?**
  - A) 1,2 g%
  - B) 1,8 g%
  - C) 2,2 g%
  - D) 3,2 g%
- 13. Které z uvedených tvrzení o mateřském mléku je správné?**
  - A) není kontraindikované při galaktosemii
  - B) je bohaté na sekreční IgA
  - C) obsahuje víc fosforu než kravské mléko
  - D) tvoří se stimulací dopaminu
- 14. Co je kolostrum?**
  - A) přechodné mléko
  - B) zralé mateřské mléko
  - C) první mléko po porodu
  - D) mléko se sníženým obsahem bílkovin
- 15. Co mají dostávat kojené děti mimo mléka?**
  - A) vitamín A
  - B) med
  - C) vitamín D
  - D) ovocnou šťávu
- 16. Strava 6-ti měsíčního prospívajícího kojeného dítěte by se měla skládat:**
  - A) výlučně z mateřského mléka
  - B) z mateřského mléka a masovo-zeleninového příkrmu
  - C) z mateřského mléka a ovocného příkrmu
  - D) z mateřského mléka a aspoň ze dvou dávek umělé mateřské formule

**17. Jídelní lístek 2-letého dítěte by neměl obsahovat:**

- A) ovoce
- B) jogurt
- C) ořechy
- D) mléko

**18. Kdy se do jídelního lístku kojence zařazují moučná jídla?**

- A) ve 4. měsíci
- B) v 5. měsíci
- C) v 6. měsíci
- D) v 7. měsíci

**19. V jídelním lístku dětí se omezují:**

- A) rostlinné bílkoviny
- B) polysacharidy
- C) vláknina
- D) živočišné tuky

**20. Co je „cefalhematom“?**

- A) to samé, co porodní nádor
- B) to samé, co caput succedancum
- C) krvácení pod periost ohraničené na jednu lebeční kost
- D) prosáknutí kůže a podkožního vaziva v oblasti hlavy

**21. Při obstrukční bronchitidě jde o typ dýchaní:**

- A) vezikulární
- B) trubicový
- C) s rachoty
- D) s expiračním stridorem

**22. Ztvrdnutý obsah ve střevech při palpací břicha se nazývá:**

- A) tapotement
- B) rektomy
- C) skybala
- D) voussure

**23. Enteroragie se vyskytuje při:**

- A) krvácení z horního úseku gastroenterálního systému
- B) krvácení z dolního úseku gastroenterálního systému
- C) krvácení ze žaludku
- D) celiakii

**24. Na které místo se neaplukují subkutánní injekce?**

- A) přední část laterální strany stehna
- B) m. quadriceps
- C) do blízkosti větších cév a nervů
- D) m. biceps

**25. Intravenózní injekce se u kojenců aplikují do:**

- A) kubitálních vén
- B) véna jugularis
- C) vén na dorsum pedis
- D) vén na hlavě a dorzální části rukou

**26. Místem aplikace intramuskulárních injekcí u kojenců je:**

- A) gluteální oblast
- B) přední a zevní strana stehna
- C) m. biceps
- D) předloktí

**27. Které z uvedených vakcín obsahuje živou složku?**

- A) tuberkulóza, TRIMOVAX, poliomielitis
- B) tetanus, chřipka, hepatitida B
- C) klíšťová encefalitida, Haemophilus influenzae, vztekлина
- D) chřipka, vztekлина, pneumokok

**28. BCG - vakcina se aplikuje:**

- A) intravenózně
- B) intramuskulárně
- C) intradermálně
- D) rektálně

**29. Hepatitida B, C a D se může přenést všemi způsoby *mimo* přenosu:**

- A) intravenózně užívanými drogami
- B) fekáliemi
- C) transfuzí
- D) ejakulátem

**30. Trizomie kterého chromozomu způsobuje Dawnův syndrom?**

- A) 23
- B) 3
- C) 21
- D) 14

**31. Kolik bodů Apgarové skóre dosahuje fyziologický novorozenecký?**

- A) 4-6
- B) 6-8
- C) 7-10
- D) 10-12

**32. Kdy se projevuje fyziologický ikterus u donošených novorozenců?**

- A) 1.-2.den
- B) 2.-3.den
- C) 5.-6.den
- D) 4.-5.den

**33. Jaký je normální tlak krve u novorozence?**

- A) 75/50 mm Hg
- B) 95/50 mm Hg
- C) 45/30 mm Hg
- D) 100/45 mm Hg

**34. Na které onemocnění se dělá povinný skrining v novorozeneckém období?**

- A) anemie, porucha hemokoagulace
- B) cystická fibróza, galaktosemie
- C) fenylketonurie, kongenitální hypotyreóza
- D) diabetes mellitus

**35. Který z uvedených projevů patří mezi včasné příznaky jadrového ikteru?**

- A) křeče a epistotonus
- B) letargie a slabé sání
- C) slabost a paralýza
- D) bradykardie

**36. Který z uvedených patologických stavů se dá zjistit u novorozence obyčejně už během 24 hodin po porodu?**

- A) atrezii žlučových cest
- B) porucha pasáže gastrointestinálním systémem
- C) glykogenóza
- D) gastreozofageální reflux

**37. Jaké koncentrace glukózy je možné podávat do periferní žíly?**

- A) do 12,5 %
- B) nad 15 %
- C) do 10 %
- D) jen v rozmezí 15-20 %

**38. Dětský pacient přivezený v bezvědomí na oddělení, je zaintubovaný. Jeho vitální funkce jsou stabilizované, křeče nebyly pozorovány, poranění není vidět. O jakých onemocněních je třeba uvažovat (2)?**

- A) epilepsie
- B) diabetes mellitus
- C) úraz hlavy
- D) intoxikace

**39. Nejhļubší porucha vědomí:**

- A) sopor
- B) somnolence
- C) koma
- D) stupor

**40. Které z následujících tvrzení *není* správné:**

- A) nejčastější přičinou selhání vitálních funkcí u dětí jsou těžké poruchy srdečního rytmu a vrozené vady srdce
- B) neléčený šok vždy končí jako multiorgánové selhání
- C) nejčastější přičinou selhání vitálních funkcí u dětí je hypoxie
- D) poměr vdechů a stlačení hrudníku při kardiopulmonální resuscitaci je 1 : 5

**41. Jaká je při zasažení bleskem nejčastější příčina smrti?**

- A) těžké popáleniny
- B) zástava srdce a ventrikulární fibrilace
- C) šok z dehydratace
- D) šok ze strachu ze smrti

**42. Výplach žaludku je možné vykonat při:**

- A) hlubokém bezvědomí
- B) podezření na poleptání kyselinou nebo louhem
- C) požití benzínu, deriváty nafty
- D) požití neznámého léku

**43. Dítě v noci chrápe, dýchá otevřenými ústami, má „neinteligentní“ výraz tváře. O čem je třeba uvažovat?**

- A) o Dawnovém syndromu
- B) o hypotyreóze
- C) o fenylketonurii
- D) o hypertrofických adenoidních vegetacích

**44. Co je prvořadým terapeutickým zásahem v léčbě akutní epiglotitidy, pokud se vyskytuje příznaky respirační insuficience?**

- A) antibiotická léčba
- B) kortikosteroidy i.v. případně aplikované inhalačné
- C) zabezpečení průchodnosti dýchacích cest
- D) lumbální punkce na vyloučení současné meningitidy

**45. Crohnova choroba může být lokalizována v:**

- A) tlustém střevě
- B) tenkém střevě
- C) tlustém a tenkém střevě
- D) v celé trávicí trubici

**46. Jak se určuje koncentrační schopnost ledvin?**

- A) adiuretinovým testem
- B) xylózovým testem
- C) vyšetřením kreatininu a urey v séru
- D) vyšetřením tubulární resorpce fosforu

**47. Polakisurie je:**

- A) bolestivé močení
- B) časté močení
- C) unikání moči
- D) mimovolní močení

**48. Při měření krevního tlaku má šířka manžety zodpovídat:**

- A) 1/3 délky ramena
- B) 2/3 délky ramena
- C) ½ délky ramena
- D) délce celého ramena

**49. Jaký je charakteristický nález ve vnitřním prostředí při kongenitální pylorostenóze?**

- A) hypochloremická metabolická acidóza
- B) hyponatremie
- C) hypochloremická metabolická alkalóza
- D) respirační acidóza

**50. Endemická struma vzniká v oblasti s:**

- A) nadměrným příjmem selénu potravou
- B) nedostatkem zinku
- C) nedostatkem jódu
- D) vysokými teplotními výkyvy během dne

**51. Který následujících příznaků se *nevyskytuje* při hypoglykemii:**

- A) studený pot
- B) dvojité vidění
- C) poruchy chování
- D) bolesti břicha

**52. Růst dítěte *neovlivní*:**

- A) roční období
- B) růstový hormon
- C) výška rodiče
- D) délka času kojení

**53. Ductus arteriosus se po narození uzavírá:**

- A) do 10 minut po porodu
- B) do 1 týdne po porodu
- C) nezavírá se vůbec
- D) v 10. měsíci života

**54. Které z uvedených onemocnění se nejčestěji projevuje následujícími příznaky: bledost, unavitelnost, horečka, krvácivé projevy, bolest kostí, v některých případech hepatosplenomegalie a lymfadenopatie?**

- A) rabdomyosarkom
- B) Hodginův lymfom
- C) akutní leukémie
- D) meduloblastom

**55. Které maligní onemocnění je nejčastější v dětském věku?**

- A) karcinom tlustého střeva
- B) akutní lymfoblastická leukemie
- C) karcinom prsu
- D) karcinom nadledvinky

**56. Který z uvedených příznaků *není typický pro artritidu*?**

- A) otok
- B) bolest
- C) omezení pohyblivosti
- D) luxace

**57. Od kterého věku se Morův reflex pokládá za patologický?**

- A) po 3. měsících života
- B) po 1. týdnu života
- C) po 6. měsíci života
- D) po 10. měsíci života

**58. Pro febrilní křeče platí:**

- A) vznikají druhý den po objevení se teplot
- B) mohou se léčit intravenózním podáváním hydrokortizonu
- C) nejlepší prevencí je dlouhodobé podávání diazepamu
- D) vyskytují se nejčastěji v kojeneckém věku

**59. Kde vznikla první dětská nemocnice?**

- A) v Praze
- B) v Paříži
- C) v Londýně
- D) v Berlíně

**60. Předškolní věk:**

- A) od 1 do 4 let
- B) od 3 do 6 let
- C) od 2 do 5 let
- D) od 0 do 6 let

**61. Patnácti měsíční dítě ovládá:**

- A) 3 slova
- B) 50 slov
- C) 10 slov
- D) 60 slov

**62. Máte podat 4,8 mg Dexony. Ve 2 ml ampule je 8 mg. Jaké množství podáte?**

- A) 2,2 ml
- B) 1,2 ml
- C) 0,2 ml
- D) 0,7 ml

**63. Máte podat 800 000 m.j. Procain Penicilinu G. Lahvička obsahuje 1 500 000 m.j. neředěných. Kolika ml naředíte a kolik podáte?**

- A) přidám 10 ml, podám 4 ml
- B) přidám 20 ml, podám 10 ml
- C) přidám 5 ml, podám 3 ml
- D) přidám 7,5 ml, podám 4 ml

**64. Dezinfekce spojivek u novorozence po narození:**

- A) katetrizace
- B) kalmetizace
- C) sterilizace
- D) kredeizace

**65. U dětí do jednoho roku používáme při mytí vlasů:**

- A) dětské mýdlo
- B) šampón
- C) kondicionér
- D) vitamínové doplňky

**66. U dětí v bezvědomí s kyslíkovou terapií chráníme oči:**

- A) ATB mastí
- B) brýlemi
- C) na den kapky, na noc masti+vlhké čtverce
- D) není třeba oči chránit

**67. Kdy se začínají prořezávat obvykle první zuby?**

- A) 3-4 měsíc
- B) 6-7 měsíc
- C) 8-9 měsíc
- D) 10-11 měsíc

**68. Označte správné tvrzení:**

- A) složení jídelníčku u kojící matky není důležité
- B) matka přikládá dítě ke kojení v přesně stanovených intervalech
- C) fyzická zátěž před kojením mění chuť mléka
- D) tzv. přední mléko obsahuje více tuku než tzv. zadní mléko

**69. Jako enuréza se označuje:**

- A) pomočování po 2. roku života
- B) pomočování po 4. roku života
- C) pomočování po 14. měsících
- D) žádná z variant není správná

**70. Označte správné tvrzení:**

- A) u novorozenců a malých dětí vdechujeme při kardiopulmonální resuscitaci jen do úst
- B) u novorozenců a malých dětí při KPR nevykonáváme umělé dýchání, jen masírujeme hrudník
- C) u novorozenců a malých dětí vdechujeme při KPR zároveň do úst i nosu
- D) u novorozenců a malých dětí vdechujeme při KPR jen do nosu

**71. Hloubka stlačení hrudníku při KPR je u dítěte:**

- A) 3 cm
- B)  $\frac{1}{2}$  předozadního průměru hrudníku
- C)  $\frac{1}{2}$  předozadního průměru hrudníku
- D) 6 cm

**72. U dětí zahajujeme KPR:**

- A) nepřímou masáží srdce
- B) prekordiálním úderem
- C) 10 umělými vdechy
- D) 5 umělými vdechy

**73. Pokud po překotném porodu novorozeneček nekřičí:**

- A) přiložíme ho matce k prsu
- B) zabalíme ho a transportujeme do zdravotnického zařízení
- C) nedotýkáme se ho
- D) stimulujeme plosky nožiček, záda a při neúspěchu zahájíme kardiopulmonální resuscitaci

**74. Kolik ml vzduchu vdechujeme do novorozence při KPR?**

- A) 100 ml
- B) 300 ml
- C) 80 ml
- D) 250 ml

**75. Poměr stlačení hrudníku a záchranných vdechů na obnovení krevního oběhu a dýchání u dítěte do jednoho roku vykonávaný profesionálními záchranáři je:**

- A) 30:2
- B) 15:2
- C) 15:1
- D) 30:1

**76. Frekvence kompresí hrudníčku u novorozence při KPR:**

- A) 120/min.
- B) 100/min.
- C) 40/min.
- D) 60/min.

**77. Označte správné tvrzení:**

- A) u dítěte aktivujeme záchranný systém po zjištění, že nedýchá
- B) u dítěte aktivujeme záchranný systém po 5 minutách KPR
- C) u dítěte aktivujeme záchranný systém po 1-2 minutách resuscitace
- D) u dítěte neaktivujeme záchranný systém po zjištění, že nedýchá a co nejdříve ho doprovíme do zdravotnického zařízení

**78. Rozsáhlé popáleniny u malých dětí:**

- A) chladíme vlažnou vodou 8°C
- B) přikládáme led
- C) přikládáme teplý obklad
- D) nechladíme

**79. Poměr stlačení hrudníku a záchranných vdechů na obnovení krevního oběhu a dýchání je u novorozence:**

- A) 30:2
- B) 3:1
- C) 5:2
- D) 15:2

**80. Ze kterých kroků se skládá ošetřovatelský proces v pediatrii?**