

Příklady k procvičení

Aplikujte 0,2 mg Atropinu i.m. (v ampulce je v 1ml/0,5 mg), jaké množství v ml podáte:

V lahvičce je 500 mg Ampicilinu, aplikujte i.m. 150 mg. Kolika ml budete ředit a kolik ml pacientovi podáte:

V lahvičce je 400 mg Steptomycinu. Aplikujte i.m. 250 mg. Kolika ml budete ředit a kolik ml pacientovi podáte:

Aplikujte 0,1 mg Atropinu i.m. (v ampulce je v 1ml/0,5 mg), jaké množství v ml podáte:

V lahvičce je 900 000mj PNC Procain, aplikujte 300 000mj i.m.. Kolika ml budete ředit a kolik ml aplikujete:

Aplikujte 50j. Heparinu když v lahvičce je v 10 ml 50 000j.. Kolik ml podáte dítěti?

Fortum (ATB) 500 mg v lahvičce, kolika ředíte, aplikujte 90 mg

Tazocin (ATB) 2,25 g v lahvičce, kolika ředíte, aplikujte 2g

Gentamycin 80 mg ve 2 ml, aplikujte 280 mg

Unasyn (ATB) 1,5 g v lahvičce, kolika ředíte aplikujte 1,2 g

aplikujte 75 mg

aplikujte 750 mg

Ortonal 40 mg v lahvičce, kolika ředíte, aplikujte 35 mg