



Nitromint aerosol

roztok glycerol trinitrátu

- **Terapeutická indikace**
 - léčba záchvatů anginy pectoris
 - prevence záchvatů anginy pectoris při aplikaci před zátěží, která podle zkušeností může vyvolat záchvat
 - snížení plicního tlaku při AIM
- **KI** – alergie na látku, anémie, možné zvýšení nitrolebečního tlaku, primární plicní hypertenze
- **Způsob podání:** sublingvální sprej





Arduan

pipekuronium-bromin

- **Terapeutická indikace**

- indikován jakou součástí celkové balancované anestézie, k zajištění reverzibilní relaxace příčně pruhovaného svalstva v souladu s chir. indikacemi

- **Kontraindikace**

- hypersenzitivita na léčivou látku

- **Způsob podání**

- intravenózně jako iniciální bolus, dále dle potřeby





Gynipral

hexoprenalin - sulfát

- **Terapeutická indikace**
 - pro krátkodobé vedení nekomplikovaného předčasného porodu
- **Kontraindikace**
 - ICHS v anamnéze, onemocnění jater a ledvin, glaukom, astma, tachyritmie, hypertenze
- **Způsob podání**
 - intravenózní podání





Plegomazin

chlorpromazin - hydrochlorid

- **Terapeutická indikace**
 - zvládání motorického a psychického neklidu u dospělých v následujících případech: schizofrenie, těžké poruchy chování, bipolární manická fáze. Medikace u těžkých popálenin
- **Kontraindikace**
 - hypersenzitivita, glaukom, riziko retence moči, kojení, užívání citalopramu!!
- **Způsob podání**
 - intramuskulární podání

