



VENTOLÍN

- roztok k inhalaci
- Salbutamol je selektivní agonista beta₂- adrenoreceptoru
- **Terapeutická indikace:** indikovaný k léčbě nebo prevenci vzniku bronchospazmu, U pacientů s perzistující formou astmatu nemají být bronchodilatancia jedinou nebo hlavní terapií.
- Salbutamol navozuje rychlou (do 5 min) krátkodobou (4h) bronchodilataci při reverzibilní obstrukci dýchacích cest způsobené bronchiálním astmatem
- **Nesmí se podávat i.v. nebo polykat**, podávaní vždy pod dohledem lékaře





Betaloc



- Metoprolol je kardioselektivní betablokátor (blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově nižších dávkách než je potřebné k blokádě beta2-receptorů), což způsobuje blokování vzestupu tepové frekvence, srdečního výkonu, stažlivosti srdce a krevního tlaku
- **Terapeutické indikace:** Léčba tachyarytmii, zejména supraventrikulárních tachykardií, akutní infarkt myokardu
- **Kontraindikace:** A-V blok druhého a třetího stupně,sinusová bradykardie, dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, hypotenze (TK sys. Nižší než 100mm Hg), astma bronchiale, CHOPN,
- Léčba metropolem by se **neměla** přerušovat náhle. Pokud je třeba léčbu přerušit a je-li to možné, postupně ji vysazujeme v průběhu 10-14 dnů, až na 25mg jednou denně v průběhu posledních 6 dnů.





Haloperidol

- Neuroleptikum, podání pouze i.m.
- **Terapeutická indikace:** rychlému zvládnutí těžké akutní psychomotorické agitovanosti, Akutní léčba deliria, halucinace, nadměrnou aktivitu a agresivní chování
- **Kontraindikace:** deprese, komatózní stav, Parkinsonova choroba, závratě, bolest hlavy, hypotenze, tachykardie, zvracení
- Zvýšena mortalita u starších osob s demencí.
- U haloperidolu bylo vedle náhlého úmrtí hlášeno prodloužení QTc a/nebo komorové arytmie





Propofol

- Celkové anestetikum k intravenóznímu podání s krátkým účinkem.
- **Terapeutické indikace:** úvod a udržování v celkové anestézie, sedaci během diagnostických a chirurgických úkonů, sedaci u ventilovaných pacientů starších 16let na JIP.
- **Kontraindikace:** Propofol obsahuje sójový olej a nesmí být použit u pacientu kteří jsou hypersenzitivní na arašídy nebo sóju.

