



Tensiomin



- P. o. lék, který patří do skupiny ACE inhibitorů
- Používá se k léčbě hypertenze, infarkt myokardu a srdečního selhání
- Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, druhý a třetí trimestr těhotenství, zúžené dvojcípé chlopně nebo srdečnicové tepny





Lekoptin



- Intravenózní roztok používaný v případě poruch srdečního rytmu
- Je indikován k léčbě paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní s rychlým AV vedením, zahajovací léčba nestabilní anginy pectoris
- Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, kardiovaskulární šok, akutní infarkt myokardu s komplikacemi, výrazné poruchy převodu vzruchu, těhotenství a kojení, syndrom chorého sinu





Thiopental



- Celkové anestetikum pro úvod do celkové anestezie, pro bolestivé výkony je nutné doplnit analgetikem, způsobuje depresi CNS (pokles tlaku, ztráta vědomí)
- Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, bronchiální astma, městnavá srdeční slabost, šok, hypotenze





Calcium



- Intravenozní roztok
- Používá se k hypokalcémii různého druhu, prevence hypokalcémie jako součást infuzních roztoků, hyperkalemie a hypermagnezemie, otrava fluorem a kyselinou šťavelovou, pomocná léčba při akutních alergických stavech, svědící dermatózy
- Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku, hyperkalcemie, hyperkalciurie, hyperkalciurie, těžká insuficience ledvin, příznaky šoku

