



DEXAMED 8 mg/2ml injekční roztok (*dexamethasoni dihydrogenophosphas*)



- Dexamethason je syntetický glukokortikoid s protizánětlivým účinkem (7x silnější účinek než prednisolon); má antialergické, antipyretické a imunosupresivní účinky
- Dexamed je určen pro všechny formy celkové i místní injekční terapie glukokortikoidy i pro akutní případy, kdy i.v. podání glukokortikoidů může být život zachraňujícím výkonem
- **terapeutické indikace – alergická onemocnění** – asthma bronchiale, status asthmaticus, polékové alerg. reakce, edém laryngu, anafylaktická reakce, dermatitidy, alergické rhinitidy
 - **šokové stavy**- hemoragický, traumatický a septický šok jako doplňková léčba
 - **mozkový edém**
- dávkování obvykle závisí na odpovědi pacienta a závažnosti jeho stavu; obvyklá úvodní dávka je 0,5 – 20 mg/den; **vysoké dávky jsou doporučovány pro zahájení krátkodobé terapie život ohrožujícího mozkového edému:**
dospělí - úvodní dávka 50 mg i.v.;
děti (35 kg a více) – úvodní dávka 25 mg i.v.;
děti (méně než 35 kg) – úvodní dávka 20 mg i.v.
- **hlavními kontraindikacemi jsou: hypersenzitivita na účinnou nebo pomocnou látku**
- **nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům**
- **pokud použití glukokortikoidů může být život zachraňující, na kontraindikaci se obvykle nebere zřetel**



