



Adrenalin



- **Sympatikomimetikum**
- **Indikace:** Srdeční zástava- tonizace myokardu při KPR (lék první volby), fibrilace komor, anafylaktický a endotoxinový šok, bronchospasmus
- **Nejčastější kontraindikace:** Hypertenze, hypovolemie, pokročilý věk s těžkou aterosklerózou
- **Nežádoucí účinky:** Arytmie, tachykardie, bradykardie, stenokardie, bolest hlavy, nauzea, zvracení
- **Způsoby podání:** i.v, i.o., sc.,i.m.

Epinefrin se nesmí použít k vazokonstrukci při lokální anestezii nosu, uší a prstů

V průběhu léčby je nutné monitorování (Tlak, tepová frekvence, EKG)



Je vhodný pro děti i dospělé





Ebrantil



- **Účinná látka:** Urapidil
- **Indikační skupina:** hypotenziva
- **Indikace:** Hypertenzní krize, velmi závažné formy hypertenze rezistentní na běžnou terapii.
- **Kontraindikace:** Nesmí se podávat u pacientů s koarktací aorty, aortální stenóze.
- **Nežádoucí účinky:** Závratě, bolest hlavy, nevolnost
- **Nejčastější a nejrychlejší podání je i.v.**
-





Naloxon



- **Indikace:** Antidotum při intoxikaci opioidy, probuzení z anestézie
Zrušení útlumu dýchacího centra novorozenců vyvolané podáním opioidních analgetik rodiče při porodu
- **Kontraindikace:** hypersenzitivna na léčivou látku
- **Nežádoucí účinky:** hypotenze, hypertenze, tachykardie, zvracení, zimnice hyperventilace
- **Způsoby podání:** i.v., i.m. nebo s.c.
- Naloxon se musí podávat s opatrností pacientům, kteří dostali velké dávky opioidů nebo osobám závislých na opioidech
- Doba působení naloxonu může být kratší než doba účinku opioidů, proto existuje riziko návratu dechového útlumu
- **Monitorace pacienta je NUTNÁ!**





Zofran



- **Antiemetikum**
- **Indikace:** léčba nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou chemoterapií a radioterapií, také léčba pooperační nevolnosti a zvracení
- **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku, současné podávání s Apomorfinem
- **Nežádoucí účinky:** bolest hlavy, pocit tepla nebo zrudnutí, zácpa
- **Léková forma:** tablety, inj. roztok, čípek

Neměl by se podávat během prvního trimestru těhotenství



