

Celková onemocnění v graviditě

Celková onemocnění v graviditě

= patologická gravidita

- Zvýšení perinatální morbidity a mortality
- Nutná hospitalizace nebo zvýšená péče

Celková onemocnění v graviditě

- Hypertenze, preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom
- Diabetes mellitus
- Onemocnění ledvin
- Nemoci GIT
- Kardiovaskulární onemocnění
- Plicní onemocnění
- Infekce

Ledviny a močové cesty

Ledviny a močové cesty

- Akutní pyelonefritida
- Akutní uretritida a cystitida

Pyelonefritida

- S: horečka, bolest v boku (záda, třísla), třesavka, dysurie, polakisurie, někdy nauzea a zvracení
- Dg: klinická (tapottement, typická symptomatologie), urokult
- T: ATB dle citlivosti, tekutiny, analgetika, antipyretika

Cystitida

- S: normální teplota nebo subfebrilie, dysurie, hematurie
- Dg: klinická, urokult
- T: ATB dle citlivosti, tekutiny

Nemoci GIT

- Pyróza, obstipace, hemoroidy
- Gastroenteritida
- Cholestatická hepatóza
- Appendicitida
- Cholelitiáza
- Pankreatitida

Gastroenteritida

- S: bolest břicha, zvracení, průjem, někdy subfebrilie
- Dg: klinická
- T: tekutiny, střevní absorbencia, dieta

Cholestatická hepatóza

- Cholestáza v jaterních žlučovodech ve 3.trimestru
- Zvýšené riziku IUGR a antenatální smrti plodu
- Ustupuje po porodu

Cholestatická hepatoza

- S: pruritus (břicho, ruce, plosky nohou), později žloutenka, tmavá moč, světlá stolice
- Dg: klinika + zvýšení jaterních testů
- T: podle závažnosti
 - monitorace plodu + hepatoprotektiva, antihistaminika
 - ukončení těhotenství

Terapie

- lehká forma (AST, ALT do 3 ukat/l)
 - lze ambulantně
 - Essentiale, Transmetil, Ursosan
 - CTG, UZ, kontrola JT týdně
 - Indukce po 37.t.t.

Terapie

- Středně těžká forma (ALT, AST nad 3 ukat/l, střední pruritus, zvýšené žlučové kyseliny v krvi)
 - hospitalizace
 - Nad 36. t.t. ukončení těhotenství, při prematuritě intenzivní terapie
 - Ursosan 250 mg 1-1-1 p.o., Transmetil 500 mg dvakrát denně v infuzi, 10% Glc
 - LB nejméně dvakrát týdně
 - CTG 2-3krát denně, UZ á 14 dní
 - Ukončení při distresu plodu nebo při nedostatečné odezvě na léčbu

Terapie

- Těžké formy (AST, ALT nad 10 ukat/l, úporný pruritus)
- Velmi intenzivní monitorace plodu
- Ursosan 500 mg 1-1-1, Transmetil i.v.
- Často akutní S.C.

Appendicitida

- 1:1000 – 1500 těhotných
- V 1. polovině těhotenství typické příznaky, poté ztížená diagnostika
- Hluboká palpační citlivost za pravou hranou dělohy, bolestivé pohyby čípkem, pozitivní markery zánětu, subfebrilie, nauzea
- Terapie chirurgická

Kardiovaskulární onemocnění

Plicní onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění

- Srdeční vady
- Arytmie
- Ischemická choroba srdeční
- Srdeční insuficienze
- Astma bronchiale

Kardiovaskulární onemocnění

- 1. stupeň: bez fyzického omezení, asymptomatické
- 2. stupeň: při námaze symptomy (stenokardie, palpitace, dyspnoe, únava) – mírně rizikové
- 3. stupeň: symptomy při malé námaze - rizikové
- 4. stupeň: symptomy v klidu, těhotenství nedoporučujeme, velmi špatná prognoza

Kardiovaskulární onemocnění - péče

- Sledování ve specializované ambulanci
- Klidový režim
- Heparinizace
- Operativní vedení porodu, přítomnost kardiologa
- ATB profylaxe do 3.dne

Infekce

Infekce

- Hepatitidy, cytomegalovirus, rubeola, spalničky, parotitida, zoonózy...
 - Symptomatická terapie
 - Riziko VVV plodu – UZ, AMC, konzultace s infektology pediatry

Rekapitulace

- Hypertenze, preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom
- Diabetes mellitus
- Onemocnění ledvin
- Nemoci GIT
- Kardiovaskulární onemocnění
- Plicní onemocnění
- Infekce

Děkuji za pozornost!