

pronikání molekul rozpouštědla z méně koncentrovaného roztoku do roztoku koncentrovanějšího

outcome /'aut,kʌm/ výsledek, výsledek čeho, jak věc dopadne, závěr

palliative /'pæl.i.ə.tɪv/ palliativní, utišující, bolest zmírnějící

peers /pɪərz/ vrstevníci

permissible /pə'mɪs.ə.bl/ přípustný, dovolený

permit /pə'mɪt/ povolit, dovolit

pooling /pu:l.ɪŋ/ nahromadění krve nebo jiné tekutiny, nahromadění krve je následkem dilatace a zastavení oběhu v kapilárách a žilách v oblasti

possession /pə'zeʃ.ən/ majetek, vlastnictví

posttraumatic /,pəʊst.t्रɔ:,mæt.ɪk/ posttraumatický, poúrazový

precede /pri'si:d/ předcházet časově

preserve /pri'zɜ:v/ zachovat, uchovat

rape /reɪp/ znásilnit, znásilnění

reasonable /'ri:.zən.ə.bl/ přijatelný, rozumný

refusal /rɪ'fju:zəl/ odmítnutí

regional /'ri:.dʒən.əl/ regionální, týkající se dané oblasti

right /raɪt/ právo

scope /skəʊp/ rozsah

solvent /'sɒl.vənt/ ředitlo, rozpouštědlo

spouse /spaʊs/ choť, manžel/ka

standing /stænd.ɪŋ/ order /'ɔ:də/ trvalý příkaz

statute /'stætju:t/ zákon, předpis

steady /'sted.i/ stálý

survivor /sə'veɪ.vər/ přeživší, pozůstalý

take /teɪk/ time /taɪm/ trvat, věnovat čas

turn out /'tɜ:n,aʊt/ zahnout ven, naruby, projevit se

upgrade /ʌp'greɪd/ zlepšit, stoupnout, zvýšení

valid /'vælɪd/ platný, oprávněný

vent /vent/ ventilovat, otvor, průduch

Volume 2

Unit 1

1

You are called for a 55-year-old man who "suddenly collapsed." He is _____.

- Initial management of this patient's airway should include. – Insertion of an oropharyngeal airway and ventilation with bag-valve mask.*

An apnoeic and pulse less patient is unlikely to have an intact gag reflex, _____ an OPA to help control the _____. A BVM will need at least 10 Lpm of oxygen flow in order to adequately _____ the patient during ventilations.

oxygenate, apnoeic and pulse less, upper airway, necessitating

2

You respond to a college fraternity where you encounter a 19-year-old male with a partially obstructed airway. According to witnesses, he was eating pizza and drinking beer when he began to _____ his throat. The patient is able to speak in a _____ only, and he has been coughing repeatedly for about 20 minutes.

- What is the best treatment for this patient? – Remove the _____ with forceps.*

A conscious patient with a partial obstructed airway should be dealt with by _____ and continuous monitoring of patient status. Interventions like Heimlich manoeuvre are considered counterproductive, as they may actually _____ the obstruction.

To perform a needle cricothyrotomy, you should place the patient; supine with head and neck hyperextended.*