

Číslo stanoviště	Stanoviště
1	Resuscitace dospělého
2	Resuscitace dospělého s AED
3	Resuscitace dítěte
4	ABCDE
5	xABCDE
6	Rozbor 10 EKG

7	Farmakologie
8	Zajištění intraoseálního vstupu
9	Zavedení laryngeální masky

Popis	Poznámky
<ul style="list-style-type: none"> • S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!) • Bez defibrilovatelného rytmu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření NZO • Stlačování • Analýza • Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem • Znalost farmakoterapie
<ul style="list-style-type: none"> • First responder vybaven AED a samorozpínacím vakem (bezpečná defibrilace!) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření NZO • Stlačování • Analýza pomocí AED • Bimanuální ventilace
<ul style="list-style-type: none"> • S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!) • Bez defibrilovatelného rytmu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření NZO • 5x bimanuální ventilace • Stlačování • Analýza • Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem • Znalost farmakoterapie
<p>Systematické vyšetření pacienta s:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AKS • Astma / CHOPN • CMP • Intoxikace (opiát, benzodiazepin) • Hypoglykemie • Bezvědomí 	<ul style="list-style-type: none"> • Student vždy musí říct, jaké vyšetření by provedl, jinak se od lektora nedozví odpověď. Když zjistí nějakou významnou změnu, musí provést ihned intervenci (např. saturace 90 % - musí hned sám podat kyslík – lektor pouze řekne, zda se stav upravil • Znalost farmakoterapie určených stavů
<p>Primární vyšetření pacienta se závažným úrazem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Končetinové masivní krvácení a stabilizace páteře (límeč nebo kolena) • Kontrola průchodnosti DC • Kontrola PNO, O2 • Pánevní pás, extenční dlaha • Izotermická folie
<ul style="list-style-type: none"> • Sinus • Bradykardie • Tachykardie • Fibrilace síňí • Komorová fibrilace • Komorová tachykardie • AV blok • Asystolie • AIM (elevace, deprese) 	<p>Hodnocení EKG systémem RAFT nebo ALS</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Nor/Adrenalin • Nitromint • Ventolin/Syntophylin • Kortikoidy (dexamethason, methylprednisolon) • Exacyl • Dithiaden • Ketamin • Midazolam, Apaurin • Heparin, kardegic • Opiáty (morphin, fentanyl, sufentanyl) • Suxamethonium chlorid 	<ul style="list-style-type: none"> • Léková skupina • Nejčastější indikace • Případné ředění • Nejčastější kontraindikace
<p>Zajištění IO systémem EZ-IO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhmatání místa vpichu na tibii a rameni • Černé čárky na jehle • Rozdíly mezi barvami jehel • Co lze do IO aplikovat
<p>Zavedení LMA Supreme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Rozbal/namaž/zastrč" • Vybrání správné velikosti • Zavedení • Kontrola po zavedení

Samostatně

Samostatně

Samostatně