

## ŘEDĚNÍ LÉKŮ

Název	Účinná látka	Léková skupina	ředění	indikace	dávkování
<b>ADRENALIN</b>	efedrin	sympatomimetikum	Při KPR dětí: 1 amp. do 100 ml F1/1 – <b>1ml =1kg</b> 1 amp do 10 ml stříkačky dotáhnout vodou – <b>1ml = 10 kg</b>	asystolie, jemná komorová fibrilace rezistentní na defibrilaci, anafylaktický šok, alergické stavy , inhalačně u laryngitid	u KPR i.v. 1 mg opakovat po 3-5 min. u dětí 0,01mg/kg váhy
<b>CORDARONE</b>	amiodaron	antiarytmikum	300 mg do 20 ml stříkačky, dotáhnout 5% G	těžké supraventrikulární tachykardie komorové tachykardie	5 mg/kg <b>150 mg ve 3 ml ampulí</b>
<b>CALYPSOL</b>	ketamin	celkové anestetikum, silné analgetikum	do 10 ml stříkačky – 2 ml Calypsolu (100 mg) + 8 ml vody	kruté bolesti, popáleniny a úrazy, celková anestézie	<u>anestézie:</u> 1–4,5 mg/kg váhy <u>analgezie:</u> 0,5–1mg/kg váhy
<b>HEPARIN</b>	heparin	antikoagulans	<b>1 ml = 5 000 j.</b>	infarkt myokardu, plicní embolie , trombózy a tromboembolie	5 000 – 10 000 m.j.
<b>KARDEGIC</b>	kyselina acetylsalicylová	antiagregans, antitrombotikum	ředit přiloženou aquou ( 3ml)	akutní koronární příhoda	250 – 500 mg
<b>MIDAZOLAM/ DORMICUM</b>	midazolam	sedativum hypnotikum	1ml ( 5 mg) + 4 ml vody	sedace, úvod a vedení anestezie	<u>Úvod do anestézie:</u> 0,15-0,2 mg/kg i.v. <u>i.m.</u> dospělí 0,07-0,1 mg/kg dětí 0,15-0,2 mg/kg
<b>SUXAMETHONIUM</b>	suxamethonii iodidum 100 mg	myorelaxans s krátkodobým účinkem (3-5 min)	do 10 ml stříkačky – 100 mg účinné látky – v <b>1 ml 10mg = 10 kg váhy</b>	intubace, závažný laryngospasmus	0,75 – 1,25 mg / kg <b>100 mg v lahvičce</b>
<b>THIOPENTAL</b>	thiopental	anestetikum	do 20 ml stříkačky <b>v 1 ml - 25 mg – 5 kg váhy</b>	krátkodobá celková anestézie	5 mg/kg <b>500 mg v lahvičce</b>