

<b>Číslo stanoviště</b>	<b>Stanoviště</b>
<b>1</b>	<b>Resuscitace dospělého</b>
<b>2</b>	<b>Resuscitace dospělého s AED</b>
<b>3</b>	<b>Resuscitace dítěte</b>
<b>4</b>	<b>ABCDE</b>
<b>5</b>	<b>xABCDE</b>
<b>6</b>	<b>Rozbor 10 EKG</b>

<b>7</b>	<b>Farmakologie</b>
<b>8</b>	<b>Zajištění intraoseálního vstupu</b>
<b>9</b>	<b>Zavedení laryngeální masky</b>

Popis	Poznámky
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!)</li> <li>• Bez defibrilovatelného rytmu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověření NZO</li> <li>• Stlačování</li> <li>• Analýza</li> <li>• Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem</li> <li>• Znalost farmakoterapie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• First responder vybaven AED a samorozpínacím vakem (bezpečná defibrilace!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověření NZO</li> <li>• Stlačování</li> <li>• Analýza pomocí AED</li> <li>• Bimanuální ventilace</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!)</li> <li>• Bez defibrilovatelného rytmu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověření NZO</li> <li>• 5x bimanuální ventilace</li> <li>• Stlačování</li> <li>• Analýza</li> <li>• Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem</li> <li>• Znalost farmakoterapie</li> </ul>
<p>Systematické vyšetření pacienta s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AKS</li> <li>• Astma / CHOPN</li> <li>• CMP</li> <li>• Intoxikace (opiát, benzodiazepin)</li> <li>• Hypoglykemie</li> <li>• Bezvědomí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Student vždy musí říct, jaké vyšetření by provedl, jinak se od lektora nedozví odpověď. Když zjistí nějakou významnou změnu, musí provést ihned intervenci (např. saturace 90 % - musí hned sám podat kyslík – lektor pouze řekne, zda se stav upravil</li> <li>• Znalost farmakoterapie určených stavů</li> </ul>
<p>Primární vyšetření pacienta se závažným úrazem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Končetinové masivní krvácení a stabilizace páteře (límeč nebo kolena)</li> <li>• Kontrola průchodnosti DC</li> <li>• Kontrola PNO, O2</li> <li>• Pánevní pás, extenční dlaha</li> <li>• Izotermická folie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinus</li> <li>• Bradykardie</li> <li>• Tachykardie</li> <li>• Fibrilace síňí</li> <li>• Komorová fibrilace</li> <li>• Komorová tachykardie</li> <li>• AV blok</li> <li>• Asystolie</li> <li>• AIM (elevace, deprese)</li> </ul>	<p>Hodnocení EKG systémem RAFT nebo ALS</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nor/Adrenalin</li> <li>• Nitromint</li> <li>• Ventolin/Syntophylin</li> <li>• Kortikoidy (dexamethason, methylprednisolon)</li> <li>• Exacyl</li> <li>• Dithiaden</li> <li>• Ketamin</li> <li>• Midazolam, Apaurin</li> <li>• Heparin, kardegic</li> <li>• Opiáty (morphin, fentanyl, sufentanyl)</li> <li>• Suxamethonium chlorid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Léková skupina</li> <li>• Nejčastější indikace</li> <li>• Případné ředění</li> <li>• Nejčastější kontraindikace</li> </ul>
<p>Zajištění IO systémem EZ-IO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhmatání místa vpichu na tibii a rameni</li> <li>• Černé čárky na jehle</li> <li>• Rozdíly mezi barvami jehel</li> <li>• Co lze do IO aplikovat</li> </ul>
<p>Zavedení LMA Supreme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Rozbal/namaž/zastrč"</li> <li>• Vybrání správné velikosti</li> <li>• Zavedení</li> <li>• Kontrola po zavedení</li> </ul>



Samostatně

Samostatně

Samostatně