

RESUSCITACE NOVOROZENCŮ

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

GUIDELINES
2025

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®



Odložte podvaz pupečníku alespoň o 60 sekund

Delší doba může být prospěšná
Nedělej milking pupečníku
u novorozence <28 týdnů

Osušte, zabalte, stimulujte a udržujte v teple

Většina novorozenců po porodu nepotřebuje rozšířenou resuscitaci

Zhodnotte dýchání a srdeční frekvenci

Od toho se budou odvíjet další kroky

Zprůchodni dýchací cesty a proved' inflační vdechy

Toto jsou základní kroky při podpoře přechodu z extrauterinního prostředí a při resuscitaci novorozence

Komprese hrudníku a léky jsou potřeba jen zřídka

Preferovaným cévním přístupem je pupeční žíla

Zapoj rodiče

Klíčová je komunikace před porodem, během porodu i po porodu

Neočekávané porody mimo nemocnici vyžadují odlišný přístup

Zvýšená pozornost prevenci hypoxémie a hypotermie

Kojenci <32 týdnů vyžadují odlišný přístup

Plastová fólie, CPAP, nižší inflační tlak, vyšší obsah kyslíku

