EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Resuscitace novorozence

ČRR

(Pohovor a briefing před porodem)
Příprava týmu a kontrola vybavení

Porod

Novorozence osušte
Udržujte normální teplotu
Spusťte stopky nebo zaznamenejte čas

Zhodnoťte svalový tonus,
dýchání a srdeční frekvenci

Pokud dýchá lapavě nebo nedýchá:
Zprůchodněte dýchací cesty
Proveďte 5 úvodních vdechů
Zvažte monitoraci SpO_2 a EKG

Znovu zhodnoťte stav
Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku

Pokud se hrudník nezvedá:
Překontrolujte správnou polohu hlavy
Zvažte zprůchodnění dýchacích cest
dvěma zachránci nebo jinými manévry
Zopakujte umělé vdechy
Monitorace SpO_2 a EKG
Sledujte reakci novorozence

Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku

Pokud se hrudník zvedá
a srdeční frekvenci nelze zjistit nebo je
velmi pomalá (< 60/min)
Zahajte srdeční masáž
Synchronizujte komprese hrudníku s
přetlakovou ventilací (3:1)

Srdeční frekvenci překontrolujte
každých 30 vteřin
Pokud nelze srdeční frekvenci zjistit
nebo je velmi pomalá (< 60/min), zvažte
zajištění žilního vstupu a podání léků

Stav prodiskutujte s rodiči
a resuscitačním týmem

Udržujte tělesnou teplotu

60 sekund

Uspokojivá preduktální SpO_2

2 min:	60 %
3 min:	70 %
4 min:	80 %
5 min:	85 %
10 min:	90 %

Zvyšujte koncentraci kyslíku (na základě měření SpO2, pokud je k dispozici)

Po celou dobu se ptejte: Nepotřebujeme další pomoc?

www.erc.edu | info@erc.edu | www.resuscitace.cz | info@resuscitace.cz

Vydala v říjnu 2015 Evropská resuscitační rada (ERC), Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Copyright: © Evropská resuscitační rada (ERC) Referenční číslo: Poster_NLS_Algorithm_CZ_20160504