

## ŘEDĚNÍ – PŘÍKLADY

**PNC Prokain** – patří mezi heterogenní roztoky = suspenze (př. heterogenního roztoku – kakao)

Vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému spojení mezi ředícím roztokem a práškem obsah v lahvičce nabude).

Z tohoto důvodu odečítáme na každých 300 000j. 0,1ml ředícího roztoku.

Pokud máme v lahvičce prášek o 1 500 000j účinné látky, máme 300 000j celkem 5x, odečítáme vždy 5x 0,1ml = 0,5ml ředícího roztoku.

Příklady:

1. aplikujte 300 000j i.m. /v lahvičce máme 1500 000j/

vhodné je ředění 5ml - 1500 000j : 5 = 300 000 v 1 ml, do lahvičky skutečně vstříkneme pouze 4,5 ml ředícího roztoku (0,5 ml nabude v rámci toho, že se jedná o suspenzi), na lahvičku napíšeme ředěno 5 ml a všechny další náležitosti...

aplikujeme 1 ml i.m.

2. aplikujte 500 000j i.m. /v lahvičce máme 1500 000j/

vhodné je ředění 3ml - 1500 000j : 3 = 500 000 v 1 ml, do lahvičky skutečně vstříkneme pouze 2,5 ml ředícího roztoku (0,5 ml nabude v rámci toho, že se jedná o suspenzi)

3. aplikujte 200 000j i.m. /v lahvičce máme 1500 000j/

vhodné je ředění 3ml - 1500 000j : 7,5 = 200 000 v 1 ml, do lahvičky skutečně vstříkneme pouze 7 ml ředícího roztoku (0,5 ml nabude v rámci toho, že se jedná o suspenzi)

**Ampicilin** – patří mezi homogenní roztoky (př. homogenního roztoku – sůl ve vodě..)

Příklady:

1. aplikujte 500mg /v lahvičce máme 1g účinné látky/, nejdříve převedeme g na mg (1g=1000mg)

ředíme 2 ml - 1000 : 2 = 500, aplikujeme 1 ml

ředíme 4 ml - 1000 : 4 = 250, aplikujeme 2 ml

2. aplikujte 100mg /v lahvičce máme 500 mg účinné látky/,

ředíme 5 ml - 500 : 5 = 100, aplikujeme 1 ml

**Heparin Spofa** – v lahvičce máme 50 000j roztoku Heparinu

aplikujte 50j

v 10ml.....50 000j

v 1 ml.....5000j

postup ředění: do sterilní lahvičky vstříkneme 1 ml Heparinu, přidáme 9 ml fyziologického roztoku- 5000j + 9 ml fyziol.roztoku = v **10 ml máme nyní 5000j** (v 1 ml 500j, v 0,1 ml 50j)

aplikujeme 0,1 ml (50j)

## DALŠÍ VÝPOČTY – PŘÍKLADY

**Furosemid** v ampulce máme 20mg ve 2 ml (v 1 ml 10mg)

aplikujte 4 mg (pomůcka- dělit ordinované množství, tím co je v 1ml)

4 : 10 = 0,4 ml

aplikujeme 0,4 ml Furosemidu

**Atropin** v ampulce máme 0,5 mg v 1 ml  
aplikujte 0,1 mg  
 $0,1 : 0,5 = 0,2$  ml  
aplikujeme 0,2 ml Atropinu

**Převod % na mg – př.**

Dolsin 5% roztok v 1 ml

5g	ve 100 ml
5000mg	ve 100 ml
50 mg	v 1 ml

Atropin 0,05% roztok v 1 ml

0,05g	ve 100 ml
50mg	ve 100 ml
0,5 mg	v 1 ml

**Křížové pravidlo pro ředění**

**Co mám**

**díly** (určím, co je jeden díl – př. 10 ml, 100ml)

– +

**Co chci**

+ –

**Čím ředím**

**díly** (určím, co je jeden díl – př. 10 ml, 100ml)

Příklad

Ordinace připravte 10% roztok alkoholu v 500 ml 5% glukózy. K dispozici máme 96% (lze počítat jako by byl 100%) alkohol.

**96% (100%) alkohol**

**15 dílů** (1 díl = 5 ml) = 75 ml 100% alkoholu

**10%**

**5% G**

**90 dílů** (1 díl = 5ml) = 450 ml 5% G

**10% Persteril**

**1 díl** (1 díl = 10ml) 10ml 10% Persterilu

**1%**

**Ředím vodou 0%**

**9 dílů** (1 díl = 10 ml) 90 ml vody