

Máte v nabídce výsledky, ale spočítejte si celé ředění.

Aplikujte 0,2 mg Atropinu i.m. (v ampulce je v 1ml/0,5 mg), jaké množství v ml podáte:

- a) 0,4 ml
- b) 0,2 ml
- c) 0,25 ml
- d) 2 ml

V lahvičce je 500 mg Ampicilinu, aplikujte i.m. 150 mg. Kolika ml budete ředit a kolik ml pacientovi podáte:

- a) 3 ml, 2 ml
- b) 10 ml, 6 ml
- c) 5 ml, 4 ml
- d) 5 ml, 1,5 ml

V lahvičce je 400 mg Steptomycinu. Aplikujte i.m. 250 mg. Kolika ml budete ředit a kolik ml pacientovi podáte:

- a) 6 ml, 3 ml
- b) 4 ml, 2,5 ml
- c) 10 ml, 8 ml
- d) 2 ml, 1,5 ml

Aplikujte 0,1 mg Atropinu i.m. (v ampulce je v 1ml/0,5 mg), jaké množství v ml podáte:

- a) 0,2 ml
- b) 0,4 ml
- c) 0,5 ml
- d) 0,3 ml

V lahvičce je 900 000mj PNC Procain, aplikujte 300 000mj i.m.. Kolika ml budete ředit a kolik ml aplikujete:

- a) 3 ml, 1 ml
- b) 3 ml, 1,5 ml
- c) 5 ml, 2,5 ml
- d) 3 ml, 3 ml

Aplikujte 50j. Heparinu když v lahvičce je v 10 ml 50 000j.. Kolik ml podáte dítěti?