


Kraniocerebrální poranění v PNP

1) Etiologie



- 1) DN – cca 60%
- 2) pády – cca 10% (z toho 90% děti a senioři)
- 3) sporty, napadení, střelná poranění – cca 10%
- 4) průmysl – cca 8%
- 5) ostatní – cca 12%

2) FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A NÁSLEDNÝ VÝVOJ KCP

- **pohlaví - muži 2 – 2,8x více než ženy**
- **nižší sociální statut - alkohol**
 - přidružené onemocnění
- **návykové látky - 56% KCP u dospělých pozitivní abusus alkoholu**
 - stále narůstající počet pod vlivem jiných látek
- **věk - nejčastější skupina 15 - 24 let**
 - děti 5 - 10 let
 - senioři

3) MECHANISMY

- **translační** - náraz do překážky nebo předmět do hlavy
- **akcelerační** - zrychlení bez nárazu
- **decelerační** - zpomalení
- **rotační** - prudké otočení - úhlové zrychlení
- u KCP téměř vždy kombinace těchto mechanismů

4) ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE KCP

časová posloupnost

primární

sekundární

prostorová charakteristika

fokální

difúzní




4a) PRIMÁRNÍ

- **zlomeniny**
- **fokální** - kontuze
- **hematomy** - subdutální
 - epidutální
 - intracerebrální
- **difúzní poranění mozku** - komoce
 - difúzní axonální poranění
- **lacerace**
- **penetrující poranění**

4b) SEKUNDÁRNÍ


- edém
- poškození mozkové kúry
- traumatické SAK
- hematom
- zduření mozku způsobené vazodilatací



ischémie nekróza

4c) SEKUNDÁRNÍ SYSTÉMOVÉ INZULTY

inzult	příčina v akutní fázi KCP	
1. hypoxémie	ypoventilace, trauma hrudníku, aspirace, interní onemocnění	▲ CBF, CBV a ICP
2. hypotenze	hypovolémie, míšní trauma, kardiální dekompenzace	▼ CBF
3. hyperkapnie	respirační deprese	▲ CBF, CBV a ICP
4. hypokapnie	hyperventilace spontánní nebo indukovaná	redukce CBF a ICP
5. hyperglykémie	stresová reakce, iatrogenní, hypotermie	
6. hypoglykémie	předchorobí,abusus alkoholu - zhoršení neurologického defektu	
7. hyponatrémie	iatrogenní - nevhodné podání roztoků	▲ ICP



Vazogenní mozkový edém


- vzniká poruchou hematoencefalické bariéry (HEB)
- provází nejčastěji nádory a záněty
- příznivě reaguje na terapii kortikoidy (hlavně dexametazon), terapie osmotickými látkami (manitol) může způsobit rebound fenomén (dostane-li se manitol do parenchymu, otok se zhorší)

Cytotoxický mozkový edém

- vzniká jako následek hypoxie buňky a je doprovázen poruchou membránové rovnováhy
- voda je především intracelulárně
- nejčastějším etiologickým činitelem je úraz

Herniace


- **Herniace cingulární**
- gyrus cinguli (gyrus obkružující mediálně corpus calosum) se vtlačuje pod falx cerebri
- typicky při jednostranných procesech ve frontálním laloku
- patrná jak na CT tak na angiografii (přesun a.cerebri anterior pod falxem – signum falcis)
- klinicky nemá nápadnější příznaky
- může ale dojít ke kompresi či zalomení a. cerebri anterior – ischémie – prohloubí symptomatologii (obrna DK...)



- 3 - cingulární

Centrální herniace (transtentoriální)

- Descendentní transtentoriální herniace – laterální
- Temporální (2) či unkální konus (1) zejména při ložiskových procesech temporálních aj.
- **Klinické projevy:**
- **ipsilaterální mydriáza** s vyhaslou fotoreakcí až **kompletní paréza n. III**
- při laterálním tlaku na kmen mozkový **porucha vědomí s kontralaterální hemiparézou, decerebrační křeče**, při progresi **postižení dechových a oběhových center**
- při přetlačení kmene na opačnou stranu může útlakem o tentorium i zde vzniknout **mydriáza**, která je pak **kontralaterální**, zatímco **hemiparéza** je ke konusu **ipsilaterální**
- při tlaku tentoria na a. cerebri posterior – **infarkt** v jejím povodí




- 1 – unkální, 2- centrální

Centrální herniace (transtentoriální)

Descendentní transtentoriální herniace – centrální

- Axiální – zejména při symetrickém zvýšení nitrolebního tlaku, posun diencefala a mezencefala kaudálně – vede k mechanickému postižení mozku, díky tahu natržení perforujících cév s vícečetnými hemoragiemi či infarkty kmene mozkového
- **Klinické projevy:**
- **kvantitativní porucha vědomí, dekortikační rigidita** se spastickými projevy, při progresi obraz **decerebrace, poruchy dýchání**
- **léze diencefala** – zornice miotické, reagující
- **léze mezencefala** – zornice středně široké nebo mydriatické, fixované



- 2 - centrální


Centrální herniace (transtentoriální)

Ascendentní transtentoriální herniace

- Klinické projevy:
- nauzea, zvracení
- progredující porucha vědomí bez lokalizačních příznaků
- vývoj obstrukčního hydrocefalu

Okcipitální herniace

- Tonzilární – tonsily mozečku vtlačovány do foramen occipitale magnum, tím dochází ke kompresi oblongaty.
- Klinické projevy:
- bolest v záhlaví, závratě, zvracení
- opistotonus
- parestézie obou HK
- hrozí rychlá progrese – s postižením dechového a vazomotorického centra, bilaterální mydriáza a pokles svalového tonu



- 6 - okcipitální

6) Advanced Trauma Life Support

- airway maintenance
- breathing and ventilation
- circulation with haemorrhage control
- disability assessment, neurological status
- exposure and environmental control

7) Indikace OTI cíl SpO₂ nad 95% EtCO₂ 30-35mmHg

mělké povrchní dýchání - hypoxémie, hypo-hypercapnie,

+ nedostatečná analgézie stresová odpověď s metabolismu mozku,
hyperglykémií



GCS <=8 → analgézie → sedace → relaxace → OTI

VENTILACE + MONITORING Et CO₂ 30-35mmHg

fiziologickou frekvencí, preference VT,
PEEP do 8mmHg
zabránění interference s řízenou ventilačí

zabránění
↑ ICP

A n a l g é z i e + S e d a c e + (R e l a x a c e)

8) STABILIZACE OBĚHU

- cílem dosáhnout **MAP 90mmHg v co nejkratší době**
- hypotenze se systolickým tlakem pod 90mmHg zdvojnásobuje výslednou moratlitu
- pokud úvodní infuze plných krystaloidů a koloidních roztoků nevede v řádu minut k normalizaci TK přistoupit k podpoře sympathomimetiky
- lékem volby noradrenalin v kontinuálním podání doplněný případně o dopamin či dobutamin

9) ORINTAČNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Klíčové pro zhodnocení závažnosti KCP

Sledování **dynamiky** a včasná dg nitrolební hypertenze

- GCS každou modalitu zvlášť
- velikost postavení a fotoreakce zornic (nic víc)
- motorika všech končetin

Dynamicky znamená opakováně !

GCS 13 – 15	KCP lehké	RTG (CT)	standard observace
GCS 9 – 12	KCP střední	CT	intenzivní péče
GCS 3 – 8	KCP těžké	CT	komplexní resuscitace

10) ORIENTAČNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

P	L	stav zornic	klinický význam
+	+	pupily úzké, reagují na osvit	normální nález
(+)	+	P rozšířená reakce obleněná	pravostranná léze, útlak
●	●	L úzká reaguje	
-	+	P široká, nereaguje	progrese stavu
●	●	L úzká reaguje	
-	-	P a L středně široké	léze středního mozku
●	●	P a L nereagující	tentoriální herniace
-	-	P a L široké nereagující	medulární léze terminální stav
●	●		

11) ADEKVÁTNÍ TRANSPORT

- elevace hlavy o 15 – 30 stupňů
- kontrola případného venózního městnání!
$$\text{CPP} = \text{MAP} - \text{ICP} + \text{VP}$$
- měření **EtCO₂** u každého KCP na UPV !
- monitoring dynamiky neurol. symptomů !
- avizovaný transport do místa definitivního ošetření 24hod neurochirurgická péče
- zlatá hodina

12) Algoritmus péče o těžké trauma GCS méně jak 8

předpoklad přidružených poranění

- kompletní spinální protektivní zajištění
- vyloučení zevních výrazných krvácení
- vyloučení tenzního PNO
- komplexní resuscitační péče
- komplexní monitoring
- pravidelná kontrola dynamiky neurologických symptomů s cílem podchycení nárůstu ICP - přechodu do fáze dekompenzace a jeho včasná léčba
- avizo a transport na odpovídající pracoviště s 24 hodinovou neurochirurgickou péčí včetně JIP