

1. Fyziologická hodnota TK u pětiletého dítěte (využijte vzoreček pro orientační posouzení TK)
2. Co budete sledovat a jaké zásady dodržovat u dítěte po katetrizaci srdce:
 - a) klid na lůžku 24 hodin, FF po 1 hod., krvácení v místě stehna, tlumit bolest, aplikovat infúze
 - b) klid na lůžku do druhého dne, sledování FF po narkóze, zachování hybnosti a citlivosti DK
 - c) sledování FF po celkové anestezii po 30 min., klid na lůžku 24 hod., komprimace vstupu cévky, přes obvaz sáček s pískem, kontrola krvácení, barva kůže, citlivost DK, sledování celkového stavu.
3. Při hematemezi –
 - a) uvědomím lékaře, zajistím klid na lůžku, přiložím led na nadbříšek, změřím FF
 - b) odeberu krev na TRF, nic per os, určím přibližnou ztrátu krve a její charakter
4. Je jaro. Dítě je dušné, neklidné, bledé až cyanotické, z pocené, kašle. Vzpěrem rukou si pomáhá v překonání dušnosti, hrudník je v inspiračním postavení. Jde o onemocnění.....
5. Upravte postup péče o dítě v záchvatu /označte kompetence sestry/
 - sestra jedná klidně a psychologicky vhodně
 - ihned uložit do zvýšené polohy
 - aplikuje podkožně, venózně i inhalační terapii sama
 - zapne nebulizátor
 - aplikuje kyslík
 - kontrola FF
 - upraví dietologii bez alergenů
 - zaznamená stupeň záchvatu, stupeň kašle, množství hlenů
 - zajistí alergologické vyšetření
6. Mezi metody pasivní rehabilitace patří:
 - a) výdech proti odporu
 - b) nácvik hlubokého dýchání
 - c) drenážní poloha
 - d) nafukování rukavice
7. Máte v denní službě v péči 7 letého pacienta se zlomeninou stehenní kosti. Ošetrovatelská péče zahrnuje: **Nehodící se škrtněte:**
hyg.-epid režim,
volný režim pohybu,
psychickou pohodu,
hygienickou péči si dítě zajistí s dopomocí,
s kůží nemá problémy,
stravu dostává dítě s omezením cukrů,
denně se odebírá krev a moč na bílkovinu,
provádí se hodnocení soběstačnosti,
na doprovod nemá dítě nárok,
dítě je hospitalizované s matkou a ta přebírá péči o dítě.

8. Fyziologický roztok (F1/1) obsahuje NaCl:

- a) 0,009%
- b) 0,9%
- c) 9%
- d) 90%

Jak si roztok připravíte např. pro výplach nosu doma:

9. Doplňte min. 2 ošetř. problémy pro dítě s dg. defekt komorového septa v pooperačním období 1 až 3 den

10. Popište zásady a způsob aplikace léčiv - **konkrétně kapek** na sliznici dýchacích cest u kojence:

11. Jakými způsoby (kromě cévkování) odeberete moč (u kojence a batolete) na mikrobiologické vyšetření. **Napište hlavní zásady validního odběru.**

12. Jaká je optimální možnost pro posouzení fyziologického vývoje váhy a výšky u 2 ročního dítěte.

15. Jak naředíte k podání:

Tazocin (ATB) 2,25 g v lahvičce, kolika ředíte, aplikujte 2g

PNC prokain (1 500 000j. v lahvičce) - ordinace lékaře: 300 000j i. m.

Fortum (500 mg v lahvičce) – ordinace lékaře 80 mg i.m.