




ARYTMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI




MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.



ELEKTROKARDIOGRAFICKÝ ZÁZNAM STAHU




PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ



HODNOCENÍ EKG KŘIVKY

- **Frekvence**
- **Jaký je tvar komplexu QRS?**
 - Úzký = normální x široký
- **Je rytmus pravidelný nebo nepravidelný?**
 - Podle komplexů QRS
- **Jsou přítomné vlny P (=je aktivita síní?)**
 - Před každým komplexem = sinusový rytmus
- **Jak jsou vlny P vázané ke komplexům QRS?**


SINUSOVÝ RYTMUS



DĚLENÍ PORUCH RYTMU PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK


- Podle závažnosti: benigní – **maligní**  **KPR!!!**
- Podle vnímání nemocným: asymptomatické – **symptomatické**
(přeskakování, bušení, palpitace až pocit zastavování, někdy závratě, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí – kardiální synkopa...)
- Podle rychlosti: tachyarytmie – bradyarytmie
- Podle hemodynamické odezvy: nevýznamné x **hemodynamicky významné**
 - hypotenze, snížení srdečního výdeje, synkopa, ischemie myokardu

TACHYKARDIE – PRAVIDELNÉ SINUSOVÁ





sinus tachycardia

SUPRAVENTRIKULÁRNÍ





TACHYKARDIE S ÚZKÝMI KOMPLEXY

FLUTTER SÍNÍ 3:1





NEPRAVIDELNÁ TACHYKARDIE

TACHYFIBRILACE SÍNÍ




TACHYKARDIE SE ŠIROKÝMI KOMPLEXY QRS

Ventricular Tachycardia



BRADYKARDIE

SINUSOVÁ BRADYKARDIE



BRADYKARDIE

AV BLOK I, II a III stupně

First degree AV block



Second degree AV block (Mobitz I or Wenckebach)



Second degree AV block (Mobitz II)



Second degree AV block (2:1 block)



Third degree AV block with junctional escape



TERAPIE TACHYKARDIÍ

pouze nestabilní pacient se závažnými příznaky!
Šok, synkopa, srdeční selhávání, ischemie myokardu

- Úzké komplexy – pravidelné

- **Vagové manévry – masáž karotického sinu, tlak na oční bulby, Valsalvův manévr**
- Adenosin 6 mg – 12 mg – 18 mg

- Úzké komplexy – nepravidelné – FiS

- Betablokátor nebo verapamil

- Široké komplexy:

- Amiodaron 300 mg /20 – 60 min. a dále 900 mg/24 hodin

- Nestabilní pacient:

- kardioverze se synchronizovým výbojem až 3 x + Amiodaron 300 mg/10 – 20 min. + dále 900 mg/24 hod.

TERAPIE BRADYKARDIÍ

- **Atropin 0,5 mg i.v. – opakovaně až do dávky 3 mg – pokud bez efektu, pak:**
 - Adrenalin 2-10 mcg/min
 - Zevní kardiostimulace