

Endometrioza

Mgr. Štěpánka Vybíralová



Definice

- chronické a zánětlivé onemocnění
- patologické uložení endometria (děložní sliznice)
- estrogen dependentní onemocnění - postihuje ženy ve fertilním věku

Klasifikace

1. **dle lokalizace ložisek** (peritoneální, ovariální, retroperitoneální, vnitřní (uvnitř svaloviny), extragenitální (mimo pohlavní orgány)
2. **dle míry postižení** - zjištění při laparoskopii (minimální, mírná, střední, těžká)

Lokalizace endometriózy

- nejčastější lokalizace - pánevní, konkrétně na sakrouterinních vazech, poté vaječníky
- může se vyskytovat kdekoliv na těle (popsány případy výskytu i na mozku)

- **endometriosis genitalis**
 - **interna uteri et tubae** = postihuje myometrium nebo vejcovody
 - **externa** = postižení sakrouterinních vazů nebo vaječnicků
- **endometriosis extragenitalis** - všechny ostatní ložiska

Typy endometriozy

- tři základní typy ložisek
1. červená - časná aktivní ložiska s hemoragickým obsahem, ložisko má vzhled plamene
 2. černá - ložiska modré až černé barvy
 3. bílá - bílé zjizvení jen fibrotizací

Symptomatologie

- liší se dle lokalizace
- **sterilita** (postižení vaječníků)
- **bolest** (postižení sakrouterinních vazů, rektovaginálního septa nebo myometria)
- **abnormální děložní krvácení**
- **asymptomatický průběh až 1/3 případů**

Diagnostika

- anamnéza
- gynekologické vyšetření
- sonografické vyšetření
- laparoskopie = vizualizace, odběr materiálu na cytologii a histologii

Léčba

- postup dle lokalizace ložisek, velikosti ložisek a obtíží pacientky
- léčba vedena dle hlavního problému pacientky (bolest, sterilita)
- kombinace konzervativní a chirurgické léčby
- **chirurgická léčba** : destrukce a odstranění ložisek, většinou laparoskopicky
- **konzervativní léčba**: zablokování vlivu přirozených hormonů na ložiska, využívá se k předoperačnímu zmenšení ložisek, u rozsáhlých nálezů nebo k potlačení subjektivních obtíží