

Číslo stanoviště	Stanoviště
1	Úvod do resuscitace dospělého
3	Úvod do resuscitace dítěte
4	ABCDE
7	Farmakologie
8	Zajištění intraoseálního vstupu

9

Zavedení larynegeální masky

Student prokáže znalost vybraných t

- Náležitá odborná úroveň.
- Jaké znáte odborné společnosti.
- Jaké znáte doporučené postupy (Č
- Odborná způsobilost.
- Vedoucí výjezdové skupiny a jeho
- Ošetřující zdravotnický pracovník.
- Specifická ošetrovatelská péče.
- Co je to indikace.
- Činnosti (kompetence) zdravotnick
- Činnosti řidiče vozidla zdravotnick

Popis	Poznámky
<ul style="list-style-type: none"> • S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!) • Bez defibrilovatelného rytmu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření NZO • Stlačování • Analýza • Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem • Znalost farmakoterapie • <i>Součástí stanoviště není zavedení LMA</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Bez defibrilovatelného rytmu • S defibrilovatelným rytmem (bezpečná defibrilace!) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření NZO • 5x bimanuální ventilace • Stlačování 15:2 • Analýza • Bimanuální ventilace s O2 a rezervoárem • Znalost farmakoterapie, ředění adrenalinu • <i>Součástí stanoviště není zavedení LMA</i>
<p>Systematické vyšetření pacienta s:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AKS • Astma / CHOPN • CMP • Intoxikace (opiát, benzodiazepin) • Hypoglykemie • Bezvědomí (viz hypoglykémie, intoxikace) • Křeče 	<ul style="list-style-type: none"> • Student vždy musí říct, jaké vyšetření by provedl, jinak se od lektora nedozví odpověď. Když zjistí nějakou významnou změnu, musí provést ihned intervenci (např. saturace 90 % - musí hned sám podat kyslík – lektor pouze řekne, zda se stav upravil • Znalost farmakoterapie určených stavů
<ul style="list-style-type: none"> • Nitromint • Ventolin, Atrovent, Berodual, Syntophylin • Dexamethason, Methylprednisolon • Midazolam, Apaurin • Heparin, Kardegic • Morphin, Fentanyl, Sufentanyl • Anexate • Intrenon 	<ul style="list-style-type: none"> • Léková skupina • Nejčastější indikace • Případné ředění • Nejčastější kontraindikace • Dávkování
	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhmatání místa vpichu na tibii a rameni • Černé čárky na jehle • Rozdíly mezi barvami jehel • Co lze do IO aplikovat

Zavedení LMA Supreme	<ul style="list-style-type: none">• "Rozbal/namaž/zastrč"• Vybrání správné velikosti• Zavedení• Kontrola po zavedení
----------------------	---

termínů:

RR, URGMED).

oprávnění.

ského záchranáře dle § 17 Vyhlášky 55/2011 Sb. o činnostech NLZP a to včetně § 3 Činnosti zdravotnického záchranáře při poskytování záchranné služby.

Samostatně nebo ve dvojici	
Ve dvojici	https://www.resuscitace.cz/files/files/0/yhj6s/gl-2021-summary-final-cz.pdf
Ve dvojici	https://www.resuscitace.cz/files/files/0/yhj6s/gl-2021-summary-final-cz.pdf
Ve dvojici	https://urgmed.cz/nlzp/
Samostatně	https://sukl.gov.cz/
Samostatně	https://www.teleflex.com/usa/en/product-areas/emergency-medicine/intraosseous-access/arrow-ez-io-system/

Samostatně	
------------	--

o pracovníka s odbornou způsobilostí.