

NOVOROZENEK**3 - 5 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	2,5 mg	10 ml	0,5ml Calypsol + 9,5ml NaCl	1 ml
500mg/10ml	nasal	7,5 mg	10 ml	1ml Calypsol + 9ml NaCl	1,5 ml
Dormicum	i.v., i.o.	0,5 mg	5 ml	1ml Dormicum + 4ml NaCl	2,5 ml
5mg/5ml	nasal	2 mg	2 ml	neředěné	2 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,01 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	1 ml
Diazepam	per rect.	2,5 mg	tuba	rectální tuba (5mg)	1/2 dáv.
Propofol	i.v., i.o.	10 mg	2 ml	neředěné	1 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	15 mg	10 ml	1ml Thiopental + 9ml NaCl	3 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,05 mg	10 ml	1ml Naloxon + 9ml NaCl	1,2 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,05 mg	5 ml	neředěné	0,5 ml
Glucagon	i.v., i.o.	0,5 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	0,5 ml

KOJENEC**5 - 10 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	5 mg	10 ml	0,5ml Calypsol + 9,5ml NaCl	2 ml
500mg/10ml	nasal	15 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	1,5 ml
Dormicum	i.v., i.o.	1 mg	2 ml	neředěné	1 ml
5mg/5ml	nasal	2,5 mg	5 ml	neředěné	2,5 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,02 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	2 ml
Diazepam	per rect.	5 mg	tuba	rectální tuba (5mg)	1 dáv.
Propofol	i.v., i.o.	30 mg	5 ml	neředěné - anestetická dáv.	3 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	30 mg	10 ml	2ml Thiopental + 8ml NaCl	3 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,10 mg	10 ml	1ml Naloxon + 9ml NaCl	2,5 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,10 mg	5 ml	neředěné	1 ml
Glucagon	i.v., i.o.	0,5 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	0,5 ml

MALÉ DÍTĚ**10 - 18 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	7,5 mg	10 ml	1ml Calypsol + 9ml NaCl	1,5 ml
500mg/10ml	nasal,i.m.	20 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	2 ml
Dormicum	i.v., i.o.	2 mg	5 ml	neředěné	2 ml
5mg/5ml	nasal,i.m.	3-4 mg	5 ml	neředěné	3-4 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,015 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	1,5 ml
Diazepam	per rect.	10 mg	tuba	rectální tuba (10mg)	1 dáv.
Propofol	i.v., i.o.	60 mg	10 ml	neředěné - anestetická dáv.	6 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	60 mg	10 ml	2ml Thiopental + 8ml NaCl	6 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,15 mg	10 ml	1ml Naloxon + 9ml NaCl	3,5 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,15 mg	5 ml	neředěné	1,5 ml
Glucagon	i.v., i.o.	0,5 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	0,5 ml

MALÉ DÍTĚ**18 - 25 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	10 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	1 ml
500mg/10ml	nasal,i.m.	25 mg	2 ml	1ml Calypsol + 1ml NaCl	1 ml
Dormicum	i.v., i.o.	2,5 mg	5 ml	neředěné	2,5 ml
5mg/5ml	nasal,i.m.	5 mg	5 ml	neředěné	5 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,025 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	2,5 ml
Diazepam	per rect.	10 mg	tuba	rectální tuba (10mg)	1 dáv.
Propofol	i.v., i.o.	80 mg	10 ml	neředěné - anestetická dáv.	8 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	80 mg	10 ml	2ml Thiopental + 8ml NaCl	8 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,25 mg	10 ml	1ml Naloxon + 9ml NaCl	6 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,25 mg	5 ml	neředěné	2,5 ml
Glucagon	i.v., i.o.	0,5 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	0,5 ml

ŠKOLNÍ DÍTĚ**26 - 35 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	15 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	1,5 ml
500mg/10ml	nasal,i.m.	30 mg	2 ml	1ml Calypsol + 1ml NaCl	1,2 ml
Dormicum	i.v., i.o.	2 mg	5 ml	neředěné	2 ml
5mg/5ml	nasal,i.m.	5 mg	5 ml	neředěné	5 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,03 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	3 ml
Diazepam	per rect.	10 mg	tuba	rectální tuba (10mg)	1 dávka
Propofol	i.v., i.o.	120 mg	20 ml	neředěné - anestetická dáv.	12 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	120 mg	10 ml	3ml Thiopental + 7ml NaCl	8 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,35 mg	10 ml	1ml Naloxon + 9ml NaCl	9 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,35 mg	5 ml	neředěné	3,5 ml
Glucagon	i.v., i.o.	1 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	1 ml

ŠKOLNÍ DÍTĚ**36 - 45 KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	20 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	2 ml
500mg/10ml	nasal,i.m.	40 mg	2 ml	1ml Calypsol + 1ml NaCl	1,6 ml
Dormicum	i.v., i.o.	2,5 mg	5 ml	neředěné	2,5 ml
5mg/5ml	nasal,i.m.	5 mg	5 ml	neředěné	5 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,04 mg	10 ml	2ml Fentanyl + 8ml NaCl	4 ml
Diazepam	per rect.	10 mg	tuba	rectální tuba (10mg)	1 dávka
Propofol	i.v., i.o.	150 mg	20 ml	neředěné - anestetická dáv.	15 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	150 mg	10 ml	3ml Thiopental + 7ml NaCl	10 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,40mg	5 ml	1ml Naloxon + 4ml NaCl	5 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,40 mg	5 ml	neředěný	4 ml
Glucagon	i.v., i.o.	1 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	1 ml

DOROSTENEC**45 A VÍCE KG**

Návod na ředění léku

Lék	Aplikace	Dávka	Stříkačka	Ředění léku	Podat
Calypsol	i.v., i.o.	25 mg	5 ml	1ml Calypsol + 4ml NaCl	2,5 ml
500mg/10ml	nasal,i.m.	50 mg	2 ml	neředěné	1 ml
Dormicum	i.v., i.o.	5 mg	5 ml	neředěné	5 ml
5mg/5ml	nasal, i.m.	7,5 mg	10 ml	neředěné - 2 ampule	7,5 ml
Fentanyl	i.v., i.o.	0,05 mg	2 ml	neředěné	1 ml
Diazepam	per rect.	10 mg	tuba	rectální tuba (10mg)	1 dávka
Propofol	i.v., i.o.	200 mg	20 ml	neředěné - anestetická dáv.	20 ml
Thiopental (10ml)	i.v., i.o.	200 mg	10 ml	5ml Thiopental + 5ml NaCl	8 ml
Naloxon	i.v., i.o.	0,45 mg	5 ml	2ml Naloxon + 3ml NaCl	3 ml
Flumazenil	i.v., i.o.	0,45 mg	5 ml	neředěný	4,5 ml
Glucagon	i.v., i.o.	1 mg	1 ml	Glucagen 1 mg Hypokit	1 ml